

Groupe d'Étude des
Orthoptères et des
invertébrés en Aquitaine



FAUNA
OBSERVATOIRE DE LA FAUNE SAUVAGE
DE NOUVELLE-AQUITAINE



NUMERO SPECIAL #1

Novembre 2020

Référentiel des Orthoptères d'Aquitaine

Version 1.4 - Novembre 2020

Sylvain Bonifait & Benoît Duhazé

Citation recommandée : Bonifait S. & Duhazé B., 2020. Référentiel des Orthoptères d'Aquitaine. Version 1.4 - Novembre 2020. Locusta. Observatoire FAUNA. *Feuille de liaison de Locusta*, N.S. 1 : 1-9.

Préambule

L'association Locusta a pour objectifs la connaissance et la préservation des Orthoptères et invertébrés dans l'ex région Aquitaine^[1], ce qui passe par la diffusion des informations (article 2 des statuts de l'association). A ce titre, l'établissement d'une liste de référence des espèces mentionnées sur le territoire est un préambule indispensable à toute action de connaissance ou conservation.

Dans la période récente (> 2000), plusieurs référentiels ou documents de synthèse sur les Orthoptères d'Aquitaine et leur distribution existent, les principaux étant les suivants :

- Atlas des Orthoptères et des Mantides de France (Voisin, 2003) ;
- Catalogue permanent de l'entomofaune française : Orthoptères (Defaut *et al.*, 2009) ;
- Contribution à la connaissance des Orthoptères d'Aquitaine (Duhazé & Bonifait, 2014) ;
- Orthoptères de France, Belgique, Luxembourg et Suisse (Sardet *et al.*, 2015) ;
- Inventaire National du Patrimoine Naturel (MNHN, 2003-2019).

A ces références s'ajoutent les bases de données / systèmes d'information régionaux, consultables en ligne (e.g. Faune Aquitaine : Collectif, 2019 ; Système d'Information sur la Faune Sauvage : Observatoire FAUNA, 2019).

Les informations présentées dans ces documents sont parfois obsolètes, fragmentaires, voire erronées. Aussi, une actualisation devient nécessaire, en particulier du fait de l'évolution rapide des connaissances (nouvelles espèces, remaniements taxonomiques, etc.) dans les dernières années.

Une mise à jour de l'atlas national (Defaut *et al.*, 2009), coordonnée par l'association Ascete, est prévue pour 2020 (en prép.). Dans ce cadre, nous avons effectué, avec la contribution de Sandy Barberis, le travail de synthèse et d'actualisation des connaissances orthoptériques au cours de l'été et de l'automne 2017. Ce travail nous a permis d'établir une nouvelle liste provisoire des Orthoptères mentionnés en Aquitaine, sur une base départementale.

En 2019, un partenariat entre l'Observatoire FAUNA et Locusta a été initié^[2] ; le premier chantier vise à construire le référentiel aquitain des Orthoptères avec une méthodologie commune à tous les taxons faunistiques (Barneix & Perrodin, en prép.). Le travail de 2017 a donc été actualisé sur la base de cette méthodologie, ce qui a entraîné la réévaluation de l'ensemble des espèces, en fonction des connaissances acquises jusqu'à l'automne 2019.

Ce référentiel a vocation à constituer un outil pratique pour faciliter la connaissance des Orthoptères et leur prise en compte. C'est pourquoi les résultats obtenus sur la chorologie, le statut départemental, l'indigénat et l'endémisme (Barneix & Perrodin, en prép.) ont été complétés par des informations sur la nomenclature, la taxonomie, la distribution ou la rareté, etc. Il nous semble également important d'explicitier ici les différentes rubriques du référentiel, ainsi que les principales sources consultées.

Contenu

Il s'agit de la liste des espèces dont la présence ancienne ou récente est avérée en Aquitaine, une présence récente correspondant à une espèce ayant été observée depuis l'année charnière 2000.

La période de recensement définie par le guide méthodologique (Barneix & Perrodin, en prép.) débute en 1850. Or, une espèce d'Orthoptère a été signalée dans le première moitié du XIXème siècle et n'a pas été revue depuis. Compte-tenu de son intérêt, ce taxon a été conservé dans le référentiel, la mention bibliographique correspondante étant indiquée en commentaire.

« Nomenclature »

Les noms scientifiques sont détaillés suivant le référentiel TaxRef v13.0 de l'INPN (Gargominy *et al.*, 2019) et celui de l'Ascete (2016). Les cd-nom du référentiel TaxRef sont également listés afin de faciliter l'indexation des taxons cités.

Les noms français présentés sont ceux utilisés classiquement dans la plupart des documents de référence (à l'exception de Sardet *et al.*, 2015).

^[1] Le champ d'intervention de Locusta est la région Aquitaine à la date de création de l'association, ce qui correspond aux départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques. Le terme "Aquitaine" utilisé dans nos publications correspond donc à l'ex-région Aquitaine et non à la "Nouvelle Aquitaine".

^[2] Ces travaux s'inscrivent dans une démarche d'élaboration des référentiels de la faune sauvage de Nouvelle-Aquitaine, coordonnée par les équipes de l'Observatoire FAUNA. Une partie des résultats est consultable en ligne et téléchargeable via l'outil Référentiel-espèces (<https://observatoire-fauna.fr/programmes/referentiel-especes/rechercher-especes>).

« Chorologie »

La liste est établie par taxon et par département^[3] (24 : Dordogne ; 33 : Gironde ; 40 : Landes ; 47 : Lot-et-Garonne ; 64 : Pyrénées-Atlantiques). Les statuts départementaux ont été évalués sur la base des définitions du guide méthodologique de l'Observatoire FAUNA (Barneix & Perrodin, en prép.). En les rapportant aux spécificités des Orthoptères, ces statuts peuvent être interprétés de la manière suivante :

- **Pr** : présence certaine (signalement valide postérieur à 2010, indiquant la présence d'une population) ;
- **Pb** : présence probable (signalement valide entre 2000 et 2010 ; espèce méconnue possédant probablement au moins une population encore présente actuellement) ;
- **Occ** : occasionnel (présence irrégulière et/ou non établie, postérieure à 2000) ;
- **Acc** : accidentel (présence exceptionnelle, non établie, postérieure à 2000 ; la différence avec le statut précédent est liée au caractère étonnant ou artificiel des données, par exemple lors d'évènements climatiques ou écologiques particuliers ou encore dans le cas d'introductions anthropiques, etc.) ;
- **Da** : disparu (signalement antérieur à 2000 et espèce probablement disparue, compte-tenu des recherches effectuées, de l'évolution de ses milieux et/ou de ses populations) ;
- **Pa** : présence ancienne (signalement antérieur à 2000, sans présomption de disparition). Ce statut regroupe les données anciennes non renouvelées en période récente, correspondant à des populations établies ou encore à des observations occasionnelles ou accidentelles – soit l'équivalent des statuts Pr, Pb, Occ et Acc, pour les données antérieures à 2000, à l'exclusion des espèces probablement disparues - Da ;
- **Ind** : statut/présence indéterminé (statut actuel de présence / absence impossible à évaluer en l'état des connaissances). Cette catégorie regroupe les incertitudes liées à des lacunes de connaissance taxonomique ne permettant pas de confirmer ou d'infirmer l'identité du taxon concerné, ainsi que les incertitudes liées à l'existence de populations reproductrices (quand l'espèce n'est pas occasionnelle ou accidentelle) ;

- **Cases vides (Ab, Ai)** : absence de mention valide de l'espèce dans le département.

La liste de base a été construite à partir de Defaut *et al.* (2009) et Duhazé & Bonifait (2014), actualisée avec les découvertes récentes : bases de données des membres ou du réseau de Locusta ; Ferreira & Duhazé, 2014 ; Duhazé & Tartary, 2015 ; Duhazé & Bonifait, 2016 ; Locusta, 2017 ; Collectif, 2019 ; Bonifait, 2019 ; Observatoire FAUNA, 2019 ; Bonifait & Allegrucci, 2020.

Nous avons apporté un soin particulier à vérifier les nouvelles données (départementales ou régionales) ; les données douteuses ont été écartées. Dans certains cas, les incertitudes taxonomiques ou le manque d'éléments à notre disposition sur la présence actuelle de populations reproductrices ne nous permettent pas de nous prononcer sur la présence ou l'absence d'un taxon (statut Ind).

De manière générale, nous nous sommes basés sur l'atlas de 2009 (Defaut *et al.*) et n'avons pas effectué de revue bibliographique complète (notamment pour les données historiques^[4]). Cependant, nous avons fait des recherches spécifiques sur certaines mentions historiques, douteuses ou non documentées afin de retrouver les sources et d'évaluer le statut de ces observations ; pour ces cas particuliers, les références bibliographiques sont indiquées dans le tableau. Afin de simplifier le document, nous n'avons retenu que les espèces dont la présence ancienne ou actuelle nous semble avérée. Les espèces citées par erreur ou dont la présence n'est pas suffisamment documentée (preuves de présence, publications fiables, observateurs expérimentés, etc.) n'ont pas été retenues (*e.g.* *Acrotylus fisheri*, *Tetrix bipunctata*).

Par exemple, *Omocestus petraeus* existe de manière certaine en Dordogne, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques, mais les mentions de Kruseman (1982) au Teich (Gironde) et au col du Pourtalet (Pyrénées-Atlantiques) apparaissent problématiques pour des raisons écologiques et chorologiques (confusion possible avec *Myrmeleotettix maculatus*). Dans ce cas, le statut de l'espèce est évalué ainsi : « absence » en Gironde, mais « statut/présence indéterminé » dans les Pyrénées-Atlantiques, puisqu'il existe une mention avérée récente au pays basque, concernant un unique individu (incertitude sur la présence d'une population reproductrice).

^[3] Le présent travail consiste en l'établissement d'un référentiel-espèce et non d'un catalogue détaillé ; c'est pourquoi nous n'avons pas mentionné systématiquement les sources pour chaque occurrence taxon / département, d'autant plus que les principales sources bibliographiques sont listées dans ce document ou dans le tableau. Nous contacter ou contacter l'association Locusta en cas de besoin d'informations plus précises.

^[4] La liste présente les mentions que nous avons pu évaluer dans le cadre de cette expertise. Quelques mentions bibliographiques problématiques n'ont pas été incluses par manque de temps pour les évaluer et/ou parce que les statuts départementaux proposés par la méthode ne correspondent pas à quelques cas particuliers (*i.e.* pour les mentions douteuses anciennes).

« Indigénat »

La majorité des espèces peut être considérée comme indigène (« In ») en Aquitaine, avec les exceptions suivantes :

- **IE (introduite établie)** : espèces exogènes naturalisées, probablement d'origine anthropique récente :
 - *Eupholidoptera tyrrhenica* : espèce d'origine corse ;
 - *Gryllomorpha dalmatina* : espèce commensale, d'origine méditerranéenne ;
 - *Rhacocleis annulata* : espèce d'origine italienne (Hartz, 1969), en expansion dans la région ;
 - *Rhacocleis poneli* : espèce d'origine méditerranéenne, en expansion rapide dans la région ;
- **INE (introduite non établie)** : *Gryllus bimaculatus*, espèce exogène, fréquente en élevage (animaleries, etc.), accidentelle en Aquitaine et dont les observations correspondent probablement à des individus échappés ponctuellement ;
- **Id (indéterminée)** : *Antaxius sorrezensis* : taxon considéré comme endémique cévenol jusqu'à sa découverte en Aquitaine ; populations régionales probablement introduites (Braud *et al.*, 2016), bien qu'il soit difficile de le certifier sans analyse génétique.
- **NE (non évalué)** : *Locusta cinerascens*, *Gryllotalpa* gr. *septemdecimchromosomica* : taxons dont le statut aquitain est inconnu, ce qui ne permet pas d'évaluer leur indigénat ;

Cas particulier

Acheta domesticus : espèce commensale, probablement archéonaturalisée (donc « assimilée indigène ») et connue uniquement en milieu bâti dans la région.

Enfin, quelques autres espèces exotiques ont parfois été signalées en Aquitaine, par exemple : *Lanista annulicornis* (Walker, 1869) in Lataste, 1931 ; *Stenonemobius acrobatus* (Saussure, 1877) in Tempère, 1947 ; *Topana cincticornis* (Stål, 1873) in Morin, 2001. Leur présence est éphémère et accidentelle (probable introduction grâce à des marchandises importées, etc.). Ces espèces ne peuvent donc pas être considérées comme appartenant (ou ayant appartenu) à la faune régionale et n'ont pas été retenues dans le référentiel des Orthoptères d'Aquitaine.

« Rareté »

Les statuts sont évalués à dire d'expert à l'échelle de l'ensemble de l'Aquitaine suivant la grille suivante :

CC : très commun ; C : commun ; AC : assez commun ; AR : assez rare ; R : rare ; RR : très rare ; NRR : non revu récemment (après 2000).

Il n'existe pas d'atlas de répartition des Orthoptères d'Aquitaine, les connaissances étant encore fragmentaires sur ce groupe. Les statuts ont donc été évalués à partir de la répartition provisoire (base de données de Locusta et de ses membres ; Collectif, 2019) et de notre connaissance des Orthoptères d'Aquitaine. Dans certains cas (espèces très discrètes et peu mentionnées), les statuts ont été en partie définis par extrapolation.

De plus, le fait d'évaluer le statut à l'échelle de la région et non par domaine biogéographique implique que les statuts ne sont que partiellement comparables entre eux, car dépendant du type de distribution du taxon considéré. Par exemple, le même statut (R) a été attribué à *Conocephalus dorsalis* (ensemble de la région mais stations très ponctuelles) et *Euthystira brachyptera* (commune dans les Pyrénées), deux espèces présentant une distribution très différente l'une de l'autre.

En conséquence, la rareté est mentionnée à titre indicatif et provisoire, en l'état des connaissances actuelles. Il est d'ailleurs probable que l'amélioration des connaissances dans les années à venir entraîne une réévaluation de certains statuts. Ces limites doivent être bien comprises, tout particulièrement si ces statuts sont utilisés dans la définition d'enjeux patrimoniaux ; en cas d'incertitude, le principe de précaution doit prévaloir.

« Endémisme »

Les taxons endémiques sont signalés. Les interrogations sont liées à des taxons méconnus ou dont la taxonomie (donc le statut d'endémisme) est susceptible d'évoluer.

« Commentaire »

• Références complémentaires

Quelques références bibliographiques (non exhaustives) ont été indiquées, notamment dans le cas de mentions anciennes.

• Distribution

La distribution est très brièvement esquissée pour des taxons localisés et/ou répartis inégalement dans le territoire (e.g. espèces sabulicoles du littoral, espèces des Landes de Gascogne et de la Double ; espèces montagnardes, etc.).

Nous avons également signalé la méconnaissance de certaines espèces discrètes ou cryptiques qui sont manifestement sous-inventoriées.

• Taxonomie

Les limites taxonomiques sont discutées pour des taxons dont la présence est encore mal comprise dans la région, qui restent à identifier spécifiquement et/ou pour lesquels les outils disponibles ne nous permettent pas d'évaluer correctement le statut (identité, indigénat, distribution, etc.).

TAXONOMIE - TAXREF v.13			TAXONOMIE - ASCETE (11.II.2016)	Nom vernaculaire	Statut départemental					Indigénat	Rareté	Endémisme	Réf.	Commentaire
cd_nom	Famille	Nom complet	Nom complet		24	33	40	47	64	Aquitaine	Aquitaine			
65918	Gryllidae	<i>Acheta domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Acheta domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Grillon domestique	Pa	Pr			Pr	In	RR		[1]	Espèce commensale ayant fortement régressée ; 1 observation récente dans l'agglomération bordelaise et 2 en Pyrénées-Atlantiques
66209	Acrididae	<i>Acrotylus insubricus</i> (Scopoli, 1786)	<i>Acrotylus insubricus</i> (Scopoli, 1786)	Oedipode grenadine		Pr	Pr	Pr		In	AC			Littoral et Landes de Gascogne ; espèce potentielle dans la Double
66215	Acrididae	<i>Aiolopus strepens</i> (Latreille, 1804)	<i>Aiolopus strepens</i> (Latreille, 1804)	Aiolope automnale	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	CC			
66214	Acrididae	<i>Aiolopus thalassinus</i> (Fabricius, 1781)	<i>Aiolopus thalassinus</i> (Fabricius, 1781)	Aiolope émeraudine	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	AC			
66262	Acrididae	<i>Anacridium aegyptium</i> (Linnaeus, 1764)	<i>Anacridium aegyptium</i> (Linnaeus, 1764)	Criquet égyptien		Occ		Pa	Pr	In	RR		[2]	Occasionnel en Gironde et en Lot-et-Garonne ; d'installation récente en Pyrénées-Atlantiques
65768	Tettigoniidae	<i>Antaxius hispanicus</i> Bolivar, 1884	<i>Antaxius hispanicus</i> Bolivar, 1884	Antaxie pyrénéenne					Pr	In	RR	Ibéro-pyrénéen		
65767	Tettigoniidae	<i>Antaxius sorrezensis</i> (Marquet, 1877)	<i>Antaxius sorrezensis</i> (Marquet, 1877)	Antaxie cévenole		Pr	Pr	Pr		Id	R	National		Espèce connue de l'est des Landes de Gascogne, à rechercher ailleurs
66067	Acrididae	<i>Arcyptera fusca</i> (Pallas, 1773)	<i>Arcyptera fusca</i> (Pallas, 1773)	Arcyptère bariolée	Pr				Pr	In	R			Espèce présente dans les Pyrénées ; populations isolées en Dordogne
593306	Tettigoniidae	<i>Barbitistes serricauda</i> (Fabricius, 1794)	<i>Barbitistes serricauda</i> (Fabricius, 1794)	Barbitiste des bois					Pr	In	RR			Espèce présente dans les Pyrénées, très discrète et sous-inventoriée
536050	Tettigoniidae	<i>Bicolorana bicolor</i> (Philippi, 1830)	<i>Bicolorana bicolor</i> (Philippi, 1830)	Decticelle bicolore					Pr	In	RR			Espèce localisée ; à rechercher
66226	Acrididae	<i>Calephorus compressicornis</i> (Latreille, 1804)	<i>Calephorus compressicornis</i> (Latreille, 1804)	Criquet des dunes		Pr	Pr	Pr	Pr	In	AR			
536063	Tettigoniidae	<i>Callicrania ramburii</i> (Bolivar, 1878)	<i>Callicrania ramburii</i> (Bolivar, 1878)	Ephippigère gasconne		Pr	Pr		Pr	In	R	Ibéro-pyrénéen		Espèce commune dans le sud de la région, absente au nord-est
66270	Acrididae	<i>Calliptamus barbarus</i> (O.G. Costa, 1836)	<i>Calliptamus barbarus</i> (Costa, 1836)	Caloptène ochracé	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	CC			
66268	Acrididae	<i>Calliptamus italicus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Calliptamus italicus</i> (Linnaeus, 1758)	Caloptène italien	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	CC			
66157	Acrididae	<i>Chorthippus albomarginatus</i> (De Geer, 1773)	<i>Chorthippus albomarginatus</i> (De Geer, 1773)	Criquet marginé	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	AC			
66159	Acrididae	<i>Chorthippus dorsatus</i> (Zetterstedt, 1821)	<i>Chorthippus dorsatus</i> (Zetterstedt, 1821)	Criquet vert-échine	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	AC			
66130	Acrididae	<i>Chorthippus apricarius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gomphocerippus apricarius</i> (Linnaeus, 1758)	Criquet des adrets					Pr	In	RR			Espèce présente dans les Pyrénées
66141	Acrididae	<i>Chorthippus biguttulus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gomphocerippus biguttulus</i> (Linnaeus, 1758)	Criquet mélodieux	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	CC			
66145	Acrididae	<i>Chorthippus binotatus</i> (Charpentier, 1825)	<i>Gomphocerippus binotatus</i> (Charpentier, 1825)	Criquet des ajoncs	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	C			
66138	Acrididae	<i>Chorthippus brunneus</i> (Thunberg, 1815)	<i>Gomphocerippus brunneus</i> (Thunberg, 1815)	Criquet duettiste	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	CC			
66134	Acrididae	<i>Chorthippus vagans</i> (Eversmann, 1848)	<i>Gomphocerippus vagans</i> (Eversmann, 1848)	Criquet des pins	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	C			
66077	Acrididae	<i>Chrysochraon dispar</i> (Germar, 1834)	<i>Chrysochraon dispar</i> (Germar, 1834)	Criquet des clairières	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	AC			
65878	Tettigoniidae	<i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804)	<i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804)	Conocéphale des roseaux	Pr	Pr	Pr		Pr	In	R			Espèce présente sur l'ensemble de la région mais stations rares
65877	Tettigoniidae	<i>Conocephalus fuscus</i> (Fabricius, 1793)	<i>Conocephalus fuscus</i> (Fabricius, 1793)	Conocéphale bigarré	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	CC			
66243	Acrididae	<i>Cophopodisma pyrenaica</i> (Fischer, 1853)	<i>Cophopodisma pyrenaica</i> (Fischer, 1853)	Miramelle pyrénéenne					Pr	In	RR	Pyrénéen		Espèce endémique des Pyrénées
65894	Tettigoniidae	<i>Cyrtaspis scutata</i> (Charpentier, 1825)	<i>Cyrtaspis scutata</i> (Charpentier, 1825)	Méconème scutigère	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	AR			Espèce discrète, sous inventoriée
65688	Tettigoniidae	<i>Decticus albifrons</i> (Fabricius, 1775)	<i>Decticus albifrons</i> (Fabricius, 1775)	Dectique à front blanc	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	CC			Espèce d'expansion récente
65687	Tettigoniidae	<i>Decticus verrucivorus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Decticus verrucivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Dectique verrucivore	Pr	Pr	Pr	Pb	Pr	In	R			Espèce commune en montagne, mais relictuelle en plaine
66082	Acrididae	<i>Dociostaurus jagoi</i> Soltani, 1978	<i>Dociostaurus jagoi</i> Soltani, 1978	Criquet de Jago		Pr		Pr		In	RR			Espèce localisée sur la Pointe du Médoc et une station en Lot-et-Garonne

[1] 24 - D'Hondt, 1976

[2] 47 - Chopard, 1951

TAXONOMIE - TAXREF v.13			TAXONOMIE - ASCETE (11.II.2016)	Nom vernaculaire	Statut départemental					Indigénat Aquitaine	Rareté Aquitaine	Endémisme	Réf.	Commentaire
cd_nom	Famille	Nom complet	Nom complet		24	33	40	47	64					
66217	Acrididae	<i>Epacromius tergestinus</i> (Megerle von Mühlfeld in Charpentier, 1825)	<i>Epacromius tergestinus</i> (Megerle von Mühlfeld in Charpentier, 1825)	Criquet des salines		Pr				In	RR			Bassin d'Arcachon, à confirmer sur l'estuaire de la Gironde. Les populations d'Aquitaine correspondent au taxon <i>tergestinus</i> inféodé au littoral (prés salés).
535823	Tettigoniidae	<i>Ephippiger diurnus</i> Dufour, 1841	<i>Ephippiger diurnus</i> Dufour, 1841	Ephippigère des vignes	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	CC			
66173	Acrididae	<i>Euchorthippus declivus</i> (Brisout de Barneville, 1848)	<i>Euchorthippus declivus</i> (Brisout de Barneville, 1848)	Criquet des bromes	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	CC			
240287	Acrididae	<i>Euchorthippus elegantulus</i> Zeuner, 1940	<i>Euchorthippus elegantulus</i> Zeuner, 1940	Criquet blafard	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	C			
227817	Gryllidae	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i> (Latreille, 1804)	<i>Modicogryllus bordigalensis</i> (Latreille, 1804)	Grillon bordelais	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	CC			
837841	Tettigoniidae	<i>Eupholidoptera tyrrenica</i> Allegrucci, Massa, Trasatti & Sbordoni, 2013	<i>Eupholidoptera tyrrenica</i> Allegrucci, Massa, Trasatti & Sbordoni, 2014	Decticelle corse			Pr			IE	RR	National		Espèce d'apparition récente : une population isolée connue (Bonifait & Allegrucci, 2020)
65496	Acrididae	<i>Euthystira brachyptera</i> (Ocskay, 1826)	<i>Euthystira brachyptera</i> (Ocskay, 1826)	Criquet des genévriers					Pr	In	R			Espèce présente dans les Pyrénées
65771	Tettigoniidae	<i>Gampsocleis glabra</i> (Herbst, 1786)	<i>Gampsocleis glabra</i> (Herbst, 1786)	Dectique des brandes		Pr	Pr			In	RR			Espèce relictuelle, connue uniquement dans le camp militaire du Poteau
593309	Acrididae	<i>Gomphoceridius brevipennis</i> (Brisout de Barneville, 1848)	<i>Gomphoceridius brevipennis</i> (Brisout de Barneville, 1848)	Gomphocère pyrénéen					Da	In	NRR	Pyrénéen	[3]	Espèce endémique des Pyrénées, à rechercher
66114	Acrididae	<i>Gomphocerippus rufus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gomphocerippus rufus</i> (Linnaeus, 1758)	Gomphocère roux	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	AR			
66111	Acrididae	<i>Gomphocerus sibiricus</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Gomphocerus sibiricus</i> (Linnaeus, 1767)	Gomphocère des alpages					Pr	In	RR			Espèce présente dans les Pyrénées
65938	Phalangopsidae	<i>Gryllomorpha dalmatina</i> (Ocskay, 1832)	<i>Gryllomorpha dalmatina</i> (Ocskay, 1832)	Grillon des bastides		Pr		Pr	Ind	IE	RR			Espèce souvent commensale ; statut à préciser en Pyrénées-Atlantiques
65899	Gryllotalpidae	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> (Linnaeus, 1758)	Courtilière commune	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	AC			
79308	Gryllotalpidae	<i>Gryllotalpa vineae</i> Bennet-Clark, 1970	<i>Gryllotalpa vineae</i> Bennet-Clark, 1970	Courtilière des vignes	Pa	Pr				In	RR		[4]	Espèce méconnue, à rechercher
*	Gryllotalpidae	<i>Gryllotalpa</i> gr. <i>septemdecimchromosomica</i> Ortiz, 1958*	<i>Gryllotalpa</i> gr. <i>septemdecimchromosomica</i> Ortiz, 1958*	gr. Courtilière provençale		Ind				NE	RR			Un individu mort récolté en Gironde dont l'identité est incertaine.
65909	Gryllidae	<i>Gryllus bimaculatus</i> De Geer, 1773	<i>Gryllus bimaculatus</i> De Geer, 1773	Grillon provençal	Pa			Acc		INE			[5]	Espèce méditerranéenne, mais fréquente en animalerie et susceptible de s'échapper ponctuellement. Aucune population n'est connue pour le moment en Aquitaine.
65910	Gryllidae	<i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758	<i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758	Grillon champêtre	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	CC			
65625	Tettigoniidae	<i>Isophya pyrenaea</i> (Audinet-Serville, 1838)	<i>Isophya pyrenaea</i> (Audinet-Serville, 1838)	Barbitiste des Pyrénées	Pr	Pr		Pr	Pr	In	AR			Espèce discrète, sous inventoriée
65636	Tettigoniidae	<i>Leptophyes punctatissima</i> (Bosc, 1792)	<i>Leptophyes punctatissima</i> (Bosc, 1792)	Leptophye ponctué	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	CC			
194247	Acrididae	<i>Locusta</i> Linnaeus, 1758	<i>Locusta</i> Linnaeus, 1758	Criquet migrateur s.l.	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	AC			Seul <i>L. m. gallica</i> est actuellement considéré comme autochtone en Aquitaine sur le littoral, les Landes de Gascogne et la Double ; il a été décrit comme étant plus petit que les deux autres taxons (qui occupent la région méditerranéenne). Ces dernières années cependant, des <i>Locusta</i> ont été observés hors du littoral, des Landes de Gascogne et de la Double. De plus, des individus de grande taille (similaire à <i>L. cinerascens</i>) ont été capturés à quelques reprises hors de l'aire de <i>L. m. gallica</i> , mais également au sein de celle-ci. Des études complémentaires sont donc nécessaires pour évaluer plus précisément le statut de ces observations (taxon concerné, indigénat, etc.).
837865	Acrididae	<i>Locusta cinerascens</i> (Fabricius, 1781)	<i>Locusta cinerascens</i> (Fabricius, 1781)	Criquet cendré	Ind	Ind	Ind	Ind	Ind	NE	?			
432555	Acrididae	<i>Locusta migratoria gallica</i> Remaudière, 1947	<i>Locusta migratoria gallica</i> Remaudière, 1947	Criquet des Landes	Pr	Pr	Pr	Pr	Ind	In	AC	Sub-endémique néo-aquitain		
65891	Tettigoniidae	<i>Meconema meridionale</i> A. Costa, 1860	<i>Meconema meridionale</i> A. Costa, 1860	Méconème fragile	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	AC			
65889	Tettigoniidae	<i>Meconema thalassinum</i> (De Geer, 1773)	<i>Meconema thalassinum</i> (De Geer, 1773)	Méconème tambourinaire	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	C			

* Taxon non référencé dans le TaxRef v13.0 (groupe taxonomique informel)

[3] 64 - La Boulène in Finot, 1890
[4] 24 - Bennet-Clark, 1970
[5] 24 - Secq, 1985 in Voisin, 2003

TAXONOMIE - TAXREF v.13			TAXONOMIE - ASCETE (11.II.2016)	Nom vernaculaire	Statut départemental					Indigénat Aquitaine	Rareté Aquitaine	Endémisme	Réf.	Commentaire
cd_nom	Famille	Nom complet	Nom complet		24	33	40	47	64					
240286	Acrididae	<i>Mecostethus parapleurus</i> (Hagenbach, 1822)	<i>Mecostethus parapleurus</i> (Hagenbach, 1822)	Criquet des Roseaux	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	AC			
65923	Gryllidae	<i>Melanogryllus desertus</i> (Pallas, 1771)	<i>Melanogryllus desertus</i> (Pallas, 1771)	Grillon noirâtre	Pr	Pr	Pr	Pr		In	AR			Espèce discrète, sous inventoriée
65718	Tettigoniidae	<i>Metrioptera brachyptera</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Metrioptera brachyptera</i> (Linnaeus, 1761)	Decticelle des bruyères					Pr	In	RR			Espèce présente dans les Pyrénées, à rechercher
66250	Acrididae	<i>Miramella alpina</i> (Kollar, 1833)	<i>Miramella alpina</i> (Kollar, 1833)	Miramelle fontinale					Pr	In	RR			Espèce présente dans les Pyrénées, à rechercher
66121	Acrididae	<i>Myrmeleotettix maculatus</i> (Thunberg, 1815)	<i>Myrmeleotettix maculatus</i> (Thunberg, 1815)	Criquet tacheté		Pr	Pr	Pr	Pr	In	AR			
65932	Trigonidiidae	<i>Nemobius sylvestris</i> (Bosc, 1792)	<i>Nemobius sylvestris</i> (Bosc, 1792)	Grillon des bois	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	CC			
65944	Gryllidae	<i>Oecanthus pellucens</i> (Scopoli, 1763)	<i>Oecanthus pellucens</i> (Scopoli, 1763)	Grillon d'Italie	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	CC			
66187	Acrididae	<i>Oedaleus decorus</i> (Germar, 1825)	<i>Oedaleus decorus</i> (Germar, 1825)	Oedipode soufrée	Pr	Pr	Pr	Pr	Occ	In	AC			Littoral, Landes de Gascogne et Double ; populations isolées en Dordogne. En 64, l'espèce était mentionnée au XXème siècle (Kruseman, 1982) ; elle y a été revue en 2018, mais l'observation (un seul individu) et la proximité des populations landaises ne permettent pas d'évaluer précisément son statut (autochtone ou occasionnel)
66194	Acrididae	<i>Oedipoda caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Oedipoda caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	Oedipode turquoise	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	CC			
535831	Acrididae	<i>Oedipoda coerulea</i> Saussure, 1884	<i>Oedipoda coerulea</i> Saussure, 1884	Oedipode ibérique					Pr	In	RR	Ibéro-pyrénéen		Espèce ibérique très localisée à la frontière ; à rechercher
66196	Acrididae	<i>Oedipoda germanica</i> (Latreille, 1804)	<i>Oedipoda germanica</i> (Latreille, 1804)	Oedipode rouge	Pr			Pr	Pr	In	RR			Espèce présente dans les Pyrénées ; populations isolées en Dordogne et en Lot-et-Garonne
66085	Acrididae	<i>Omocestus haemorrhoidalis</i> (Charpentier, 1825)	<i>Omocestus haemorrhoidalis</i> (Charpentier, 1825)	Criquet rouge-queue					Pr	In	RR			Espèce présente dans les Pyrénées, à rechercher
66086	Acrididae	<i>Omocestus petraeus</i> (Brisout de Barneville, 1856)	<i>Omocestus petraeus</i> (Brisout, 1856)	Criquet des grouettes	Pr			Pr	Ind	In	R			
66087	Acrididae	<i>Omocestus raymondi</i> (Yersin, 1863)	<i>Omocestus raymondi</i> (Yersin, 1863)	Criquet des garrigues	Pr			Pr		In	RR			Populations isolées en Dordogne et Lot-et-Garonne, à rechercher
66088	Acrididae	<i>Omocestus rufipes</i> (Zetterstedt, 1821)	<i>Omocestus rufipes</i> (Zetterstedt, 1821)	Criquet noir-ébène	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	CC			
66090	Acrididae	<i>Omocestus viridulus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Omocestus viridulus</i> (Linnaeus, 1758)	Criquet verdelet					Pr	In	R			Espèce présente dans les Pyrénées ; à rechercher sur la frange limousine de la Dordogne
66223	Acrididae	<i>Paracinema tricolor</i> (Thunberg, 1815)	<i>Paracinema tricolor</i> (Thunberg, 1815)	Criquet tricolore	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	AC			
66026	Tetrigidae	<i>Paratettix meridionalis</i> (Rambur, 1838)	<i>Paratettix meridionalis</i> (Rambur, 1838)	Tétrix méridional	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	CC			
*	Phalangopsidae	<i>Petaloptila gr. pyrenaea</i> *							Pr	In	RR	Pyrénéen ?		Taxon découvert récemment (Danflous, en cours d'étude), dont l'appartenance spécifique reste à préciser
199958	Acrididae	<i>Pezotettix giornae</i> (Rossi, 1794)	<i>Pezotettix giornae</i> (Rossi, 1794)	Criquet pansu	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	CC			
65613	Tettigoniidae	<i>Phaneroptera falcata</i> (Poda, 1761)	<i>Phaneroptera falcata</i> (Poda, 1761)	Phanéroptère commun	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	CC			
65614	Tettigoniidae	<i>Phaneroptera nana</i> Fieber, 1853	<i>Phaneroptera nana</i> Fieber, 1853	Phanéroptère méridional	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	CC			
65737	Tettigoniidae	<i>Pholidoptera femorata</i> (Fieber, 1853)	<i>Pholidoptera femorata</i> (Fieber, 1853)	Decticelle des friches	Pr	Pr	Pr	Pr		In	AC			
65740	Tettigoniidae	<i>Pholidoptera griseoaptera</i> (De Geer, 1773)	<i>Pholidoptera griseoaptera</i> (De Geer, 1773)	Decticelle cendrée	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	CC			
65710	Tettigoniidae	<i>Platycleis affinis</i> Fieber, 1853	<i>Platycleis affinis</i> Fieber, 1853	Decticelle côtière	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	C			
65697	Tettigoniidae	<i>Platycleis albopunctata</i> (Goeze, 1778)	<i>Platycleis albopunctata</i> (Goeze, 1778)	Decticelle chagrinée	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	C			
65705	Tettigoniidae	<i>Platycleis intermedia</i> (Audinet-Serville, 1838)	<i>Platycleis intermedia</i> (Audinet-Serville, 1838)	Decticelle intermédiaire			Pa			In	NRR		[6]	Espèce citée par Chopard (1951) dans les Landes ; à rechercher
66235	Acrididae	<i>Podisma pedestris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Podisma cf. pedestris</i> (Linnaeus, 1758)	Miramelle des moraines					Pr	In	RR	?		Espèce présente dans les Pyrénées, à rechercher

* Taxon non référencé dans le TaxRef v13.0 (groupe taxonomique informel)

[6] 40 - Chopard, 1951

TAXONOMIE - TAXREF v.13				TAXONOMIE - ASCETE (11.II.2016)		Statut départemental		Indigénat		Rareté		Endémisme	Réf.	Commentaire
cd_nom	Famille	Nom complet	Nom complet	Nom vernaculaire	24	33	40	47	64	Aquitaine	Aquitaine			
65641	Tettigoniidae	<i>Polysarcus denticauda</i> (Charpentier, 1825)	<i>Polysarcus denticauda</i> (Charpentier, 1825)	Barbitiste ventru					Pr	In	RR			Espèce présente dans les Pyrénées, à rechercher
837913	Acrididae	<i>Pseudochorthippus montanus</i> (Charpentier, 1825)	<i>Pseudochorthippus montanus</i> (Charpentier, 1825)	Criquet palustre					Ind	In	RR			Espèce à confirmer dans les Pyrénées-Atlantiques
837869	Acrididae	<i>Pseudochorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	<i>Pseudochorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	Criquet des pâtures s.l.	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	CC			
837870	Acrididae	<i>Pseudochorthippus parallelus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	<i>Pseudochorthippus parallelus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	Criquet des pâtures s.s.	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	CC			
837871	Acrididae	<i>Pseudochorthippus parallelus erythropus</i> Faber, 1958	<i>Pseudochorthippus parallelus erythropus</i> Faber, 1958	Criquet du Val-d'Eyne					Pr	In	RR	Ibéro-pyrénéen		
*	Acrididae			Criquet des pâtures - population hybridogène (<i>Pseudochorthippus parallelus parallelus</i> x <i>erythropus</i>)					Pr	In	RR			En Pyrénées-Atlantiques, le gradient de transition entre les deux sous espèces est large, ce qui entraîne la présence de populations hybridogènes aux caractères (chant, comportement, coloration, dents stridulatoires) intermédiaires, incohérents entre eux ou ambigus. Les populations les plus proches du taxon espagnol <i>erythropus</i> se cantonnent surtout à proximité de la frontière et ont été identifiées en premier lieu sur la base du nombre de dents stridulatoires chez le mâle (les autres caractères nous semblaient – au moins pour le moment – d'utilisation plus délicate, voire potentiellement trompeurs).
66178	Acrididae	<i>Psophus stridulus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Psophus stridulus</i> (Linnaeus, 1758)	Oedipode stridulante	Da	Pr	Pr		Pr	In	RR		[7]	Espèce présente dans les Pyrénées et relictuelle en plaine
65934	Trigonidiidae	<i>Pteronemobius heydenii</i> (Fischer, 1853)	<i>Pteronemobius heydenii</i> (Fischer, 1853)	Grillon des marais	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	C			
65935	Trigonidiidae	<i>Pteronemobius lineolatus</i> (Brullé, 1835)	<i>Pteronemobius lineolatus</i> (Brullé, 1835)	Grillon des torrents	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	AR			Espèce méconnue et sous-inventoriée
536045	Tettigoniidae	<i>Rhacocleis annulata</i> Fieber, 1853	<i>Rhacocleis annulata</i> Fieber, 1853	Decticelle annelée		Pr	Ind			IE	RR			Espèce d'apparition récente ; populations isolées
65759	Tettigoniidae	<i>Rhacocleis poneli</i> Harz & Voisin, 1987	<i>Rhacocleis poneli</i> Harz & Voisin, 1987	Decticelle varoise		Pr	Pr	Pr	Pr	IE	R	National		Espèce d'apparition récente ; populations en expansion
593263	Tettigoniidae	<i>Roeseliana roeselii</i> (Hagenbach, 1822)	<i>Roeseliana roeselii</i> (Hagenbach, 1822)	Decticelle bariolée	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	C			
65882	Tettigoniidae	<i>Ruspolia nitidula</i> (Scopoli, 1786)	<i>Ruspolia nitidula</i> (Scopoli, 1786)	Conocéphale gracieux	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	CC			
65728	Tettigoniidae	<i>Sepiana sepium</i> (Yersin, 1854)	<i>Sepiana sepium</i> (Yersin, 1854)	Decticelle échassière	Pr	Pr	Pr	Pr		In	R			Espèce discrète
66200	Acrididae	<i>Sphingonotus caerulans</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Sphingonotus caerulans</i> (Linnaeus, 1767)	Oedipode aigue-marine s.l.	Pr	Pr	Pr	Pr		In	AR			Une étude récente (Husemann <i>et al.</i> , 2013) a montré que l'espèce était polyphylétique. Ce résultat a été interprété ensuite (Defaut, 2014) comme traduisant l'existence de deux taxons cryptiques correspondant au " <i>S. caerulans</i> " classique : un présent au moins sur le littoral (" <i>cyanopterus</i> ") et un autre non encore décrit (ex " <i>caerulans</i> "), présent théoriquement loin du littoral. Les connaissances actuelles sur la région ne nous permettent pas de connaître leur distribution respective (les publications sur la différenciation biométrique ne donnant pas de résultats satisfaisants à l'heure actuelle).
66201	Acrididae	<i>Sphingonotus caerulans caerulans</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Sphingonotus caerulans</i> sp. non <i>caerulans</i> (Linnaeus)	Oedipode aigue-marine s.s.	Ind	Ind	Ind	Ind		In	?			
66202	Acrididae	<i>Sphingonotus caerulans cyanopterus</i> (Charpentier, 1825)	<i>Sphingonotus caerulans caerulans</i> (Linnaeus, 1767)	Oedipode nordique	Ind	Pr	Pr	Ind		In	?			
66129	Acrididae	<i>Stauroderus scalaris</i> (Fischer von Waldheim, 1846)	<i>Stauroderus scalaris</i> (Fischer von Waldheim, 1846)	Criquet jacasseur					Pr	In	R			Espèce présente dans les Pyrénées
66100	Acrididae	<i>Stenobothrus lineatus</i> (Panzer, 1796)	<i>Stenobothrus lineatus</i> (Panzer, 1796)	Sténobothre de la Palène	Pr	Ind		Pr	Pr	In	AR			
66102	Acrididae	<i>Stenobothrus nigromaculatus</i> (Herrich-Schaeffer, 1840)	<i>Stenobothrus nigromaculatus</i> (Herrich-Schaeffer, 1840)	Sténobothre bourdonneur					Pr	In	RR			Espèce présente dans les Pyrénées
66103	Acrididae	<i>Stenobothrus stigmaticus</i> (Rambur, 1838)	<i>Stenobothrus stigmaticus</i> (Rambur, 1838)	Sténobothre nain	Pr	Pr		Pr	Pr	In	R			Espèce commune en montagne, mais relictuelle en plaine
65487	Acrididae	<i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758)	Criquet ensanglanté	Pr	Pr	Pr		Pr	In	AR			

* Taxon non référencé dans le TaxRef v13.0 (groupe taxonomique informel)

[7] 24 - Grassé, 1925 ; D'Hondt, 1986 ; Morin, 1990

TAXONOMIE - TAXREF v.13			TAXONOMIE - ASCETE (11.II.2016)	Nom vernaculaire	Statut départemental					Indigénat	Rareté	Endémisme	Réf.	Commentaire
cd_nom	Famille	Nom complet	Nom complet		24	33	40	47	64	Aquitaine	Aquitaine			
837838	Tettigoniidae	<i>Tessellana tessellata</i> (Charpentier, 1825)	<i>Tessellana tessellata</i> (Charpentier, 1825)	Decticelle carroyée	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	C			
66039	Tetrigidae	<i>Tetrix depressa</i> Brisout de Barneville, 1848	<i>Depressotetrix depressa</i> (Brisout de Barneville, 1849)	Tétrix déprimé	Pr			Pr		In	RR			Deux stations connues actuellement, en Dordogne et Lot-et-Garonne, à rechercher
66029	Tetrigidae	<i>Tetrix bolivari</i> Saulcy in Azam, 1901	<i>Tetrix bolivari</i> Saulcy in Azam, 1901	Tétrix caucasien	Pr	Pr	Pr			In	R			Espèce d'identification très difficile, méconnue
66030	Tetrigidae	<i>Tetrix ceperoi</i> (Bolivar, 1887)	<i>Tetrix ceperoi</i> Bolivar, 1887	Tétrix des vasières	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	C			
66032	Tetrigidae	<i>Tetrix subulata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tetrix subulata</i> (Linnaeus, 1758)	Tétrix riverain	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	AC			
593311	Tetrigidae	<i>Tetrix tenuicornis</i> (Sahlberg, 1891)	<i>Tetrix tenuicornis</i> (Sahlberg, 1891)	Tétrix des carrières	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	AC			
66036	Tetrigidae	<i>Tetrix undulata</i> (Sowerby, 1806)		Tétrix commun s.l.	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	CC			
837864	Tetrigidae	<i>Tetrix undulata gavoyi</i> Saulcy in Azam, 1901	<i>Tetrix gavoyi</i> Saulcy in Azam, 1901	Tétrix de Gavoy		Ind	Ind			In	?			Le taxon <i>gavoyi</i> a été récemment signalé dans la région. Néanmoins, les informations disponibles actuellement sur son identification et sa répartition ne nous permettent pas d'évaluer de manière satisfaisante son statut régional. Des études complémentaires sont donc nécessaires (critères d'identification, présence, répartition).
837863	Tetrigidae	<i>Tetrix undulata undulata</i> (Sowerby, 1806)	<i>Tetrix undulata</i> (Sowerby, 1806)	Tétrix commun s.s.	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	CC			
65869	Tettigoniidae	<i>Tettigonia cantans</i> (Fuessly, 1775)	<i>Tettigonia cantans</i> (Fuessly, 1775)	Sauterelle cymbalière					Pr	In	R			Espèce présente uniquement en montagne
65774	Tettigoniidae	<i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Sauterelle verte	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	CC			
65618	Tettigoniidae	<i>Tylopsis lilifolia</i> (Fabricius, 1793)	<i>Tylopsis lilifolia</i> (Fabricius, 1793)	Phanéoptère liliacé	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	AC			
65677	Tettigoniidae	<i>Uromenus rugosicollis</i> (Audinet-Serville, 1838)	<i>Uromenus rugosicollis</i> (Audinet-Serville, 1838)	Ephippigère carénée	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	C			
240285	Tridactylidae	<i>Xya variegata</i> Latreille, 1809	<i>Xya variegata</i> Latreille, 1809	Tridactyle panaché			Da			In	NRR		[8]	Mention ancienne sur les berges de l'Adour ; à rechercher
65752	Tettigoniidae	<i>Yersinella raymondii</i> (Yersin, 1860)	<i>Yersinella raymondii</i> (Yersin, 1860)	Decticelle frêle	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	In	C			
65726	Tettigoniidae	<i>Zeuneriana abbreviata</i> (Audinet-Serville, 1838)	<i>Zeuneriana abbreviata</i> (Audinet-Serville, 1838)	Decticelle aquitaine			Pr	Pr	Pr	In	AR			Espèce commune dans le sud de la région, absente au nord

[8] 40 – Dufour, 1831 in Audinet-Serville, 1839

« Remerciements »

Ce travail a été réalisé dans le cadre des opérations structurantes du collectif d'expertise de l'Observatoire FAUNA, grâce au soutien financier de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, de la Région Nouvelle-Aquitaine et du FEDER aquitain.

Nous tenons à remercier tous les contributeurs à la connaissance de l'Orthoptérofaune d'Aquitaine, notamment les naturalistes nous ayant fait part de leurs découvertes.

Merci également à Sandy Barberis pour sa contribution significative tout au long de l'élaboration du référentiel, ainsi qu'à Julien Bariteaud, Béatrice Ducout et Nicolas Pinczon du Sel pour leurs retours sur les versions provisoires de la liste.

« Bibliographie »

Ascete, 2016. *Liste des orthoptères de France*. Mise à jour 11 février 2016.

Audinet-Serville J.-G., 1839. *Histoire naturelle des insectes. Orthoptères*. Roret, Paris. XVIII-776 p.

Barneix M. & Perrodin J. (coord.), en prép. *Méthodologie pour l'élaboration et la diffusion des référentiels-espèces de Nouvelle-Aquitaine*. Version 2. Observatoire FAUNA.

Bennet-Clark H.C., 1970. A new French mole cricket, differing in song and morphology from *Gryllotalpa gryllotalpa* L. (Orthoptera : Gryllotalpidae). *Proceeding of the Royal Entomological Society of London*, B, 39 (9-10) : 125-132.

Bonifait S., 2019. Les découvertes récentes. *Feuille de liaison de Locusta*, 2 : 9-10.

Bonifait S. & Allegrucci G., 2020. *Eupholidoptera tyrrenica* dans les Landes, nouvel exemple de naturalisation chez les Ensifères (Orthoptera, Tettigoniidae). *Bulletin de la Société Entomologique de France*, 125 (3) : 273-282

Braud Y., Hochkirch A., Roesti C., Rutschmann F., Monnerat C., Fontana P., Presa J.J., Zuna-Kratky T. & Dusoulier F., 2016. *Antaxius sorrezensis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016. [https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T64547396A70649062.en]. Consulté le 28 février 2020.

Chopard L., 1951. *Orthoptéroïdes*. Faune de France 56. Lechevalier, Paris. 359 p.

Collectif, 2019. *Faune Aquitaine*. [http://faune-aquitaine.org].

Defaut B., Sardet E. & Braud Y. (coord.), 2009. *Catalogue permanent de l'entomofaune. Série nationale, fascicule 7. Orthoptera : Ensifera et Caelifera*. UEF, Dijon (France). 94 p.

Defaut B., 2014. Notes de lecture concernant l'étude de Husemann & al. (2013) sur les Sphingonotini ibériques (Acrididae, Locustinae). *Matériaux Orthoptériques et Entomocénétiques*, 19 : 115-120

D'Hondt J.-L., 1976. Contribution au peuplement entomologique du Val de l'Isle-en-Causse (Dordogne). III. Dictyotéroïdes et Orthoptéroïdes (deuxième partie) et essai de catalogue des espèces de Dordogne. *Bulletin de la Société entomologique du Nord de la France*, 201 : 11-16

D'Hondt J.-L., 1986. Quelques remarques autour de la présence en Dordogne de *Psophus stridulus* (Linné, 1758) (Orthoptera, Acrididae). *L'Entomologiste*, 42 (5) : 279-281.

Duhazé B. & Bonifait S., 2014. Contribution à la connaissance des Orthoptères d'Aquitaine : nouvelles données et considérations écologiques (Ensifera et Caelifera). *Matériaux Orthoptériques et Entomocénétiques*, 19 : 81-97.

Duhazé B. & Bonifait S., 2016. Découverte d'*Omocestus raymondi* (Yersin, 1863) en Dordogne (24) (Orthoptera, Acrididae). *Matériaux Orthoptériques et Entomocénétiques*, 21 : 35-36.

Duhazé B. & Tartary P., 2015. Redécouverte de *Psophus stridulus* (Linné, 1758) (Orthoptera, Acrididae) et de *Decticus verrucivorus* (Linné, 1758) (Orthoptera, Tettigoniidae) en Gironde (33). *Matériaux Orthoptériques et Entomocénétiques*, 20 : 111-113.

Ferreira K. & Duhazé B., 2014. Redécouverte de *Psophus stridulus* (Linné, 1758) dans le département des Landes (Orthoptera, Acrididae). *Matériaux Orthoptériques et Entomocénétiques*, 19 : 121.

Finot A., 1890. *Insectes Orthoptères. Thysanoures et Orthoptères proprement dits*. Faune de France, Paris, Deyrolle, 322 p.

Gargominy O., Tercerie S., Régner C., Ramage T., Dupont P., Daszkiewicz P. & Poncet L. 2019. *TAXREF v13, référentiel taxonomique pour la France : méthodologie, mise en œuvre et diffusion*. Muséum national d'Histoire naturelle, Paris. Rapport Patrinat. 63 p.

Grassé P.P., 1925. Notes sur les Orthoptères français. Orthoptères observés dans le département de la Dordogne. *Feuille des Naturalistes* : 20-25.

Harz K., 1969. *Die Orthopteren Europas*. Vol. 1. W. Junk, La Haye (Pays-Bas), 769 p.

Husemann M., Lluçia Pomares D. & Hochkirch A., 2013. A review of the Iberian Sphingonotini with description of two novel species (Orthoptera : Acrididae : Oedipodinae). *Zoological Journal of the Linnean Society*, 168 : 29-60

Kruseman G., 1982. *Matériaux pour la faunistique des Orthoptères de France, II : les Acridiens des musées de Paris et d'Amsterdam*. Instituut voor Taxonomische Zoölogie, Universiteit van Amsterdam. Verslagen en Technische Gegevens, 36 : 134 p.

Lataste F., 1931. A propos d'une Sauterelle trouvée dans un régime de Bananes. *Procès-verbaux de la Société Linnéenne de Bordeaux*, 83 : 33.

Locusta, 2017. *Feuille de liaison de Locusta*, 1. 19 p.

MNHN (éd.), 2003-2019. *Inventaire National du Patrimoine Naturel*. [https://inpn.mnhn.fr].

Morin D., 1990. Récoltes d'Orthoptères en Dordogne. *Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux*, 18 (3) : 141-142.

Morin D., 2001. Importation accidentelle de *Topana cincticornis* en Gironde (France) et signalisation d'autres espèces du groupe *Topana* – *Atopana* – *Pycnopalpa* en Guyane française [Orthoptera Tettigoniidae, Phaneropterinae]. *Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux*, 29 (1) : 27-28.

Observatoire FAUNA, 2019. *Système d'Information sur la Faune Sauvage*. [https://observatoire-fauna.fr/].

Sardet E., Roesti C. & Braud Y., 2015. *Cahier d'identification des Orthoptères de France, Belgique, Luxembourg et Suisse*. Coll. Cahiers d'identification. Biotopie, Mèze (France). 304 p.

Tempère G., 1947. Capture d'un Gryllidae. *Procès-verbaux de la Société Linnéenne de Bordeaux*, 94 : 41.

Voisin J.-F. (coord.), 2003. *Atlas des Orthoptères et des Mantides de France*. Publications scientifiques du MNHN, Paris. Patrimoines Naturels, 60 : 1-106 p.

Sommaire

Préambule	1
Contenu	1
Nomenclature	1
Chorologie	2
Indigénat	3
Rareté	3
Endémisme	3
Commentaires	3
Tableaux	4 à 8
Remerciements	9
Bibliographie	9

Bulletin de liaison spécial # 1 - Novembre 2020

Auteurs

Sylvain Bonifait ; Benoît Duhazé


Conception graphique

Rosana Zucchelli

Pour toutes remarques ou questions,
vous pouvez contacter les auteurs ou l'association :
sylvain_bonifait@yahoo.fr, duhaze.benoit@gmail.com
contact.locusta@gmail.com



Stenobothrus nigromaculatus (© Benoît Duhazé)



Groupe d'Étude des
Orthoptères et des
invertébrés en Aquitaine



FAUNA
OBSERVATOIRE DE LA FAUNE SAUVAGE
DE NOUVELLE-AQUITAINE

Avec le soutien financier de :

